

# MENNO® HYGIENEPLAN für die Eierproduktion

(Nur für professionelle Anwender) - Seite 1 von 2



Name verantwortliche Person:

Tel/Mobil während der Ausführung:

Hygienemaßnahmen im leeren Stall		Vers. 12/2023		Anwendungsempfehlungen, darüber hinaus Etiketten/Produktinformationen beachten.	Abwandlung von der Empfehlung	Name in Druckschrift	Datum, Unterschrift Beginn/Ende
<b>MENNO Anwendungsempfehlung</b>							
<b>Grundreinigung:</b> ▶ von Schmutz ▶ von Fettfilmen	Decken, Wände, Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Lüftungssysteme, Futtersilos	MENNO® CLEAN Schaumreiniger	1%	Flächen mit Schaufel und Besen von Kot, Einstreu und Futtermittelresten frei machen, einschäumen z.B. mit MENNO® Dosier-Schaumspritze, kurz einweichen und mit Hochdruckreiniger gründlich reinigen.			
<b>Grunddesinfektion:</b> ▶ gegen Viren, ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Hefepilze	Decken, Wände, Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Lüftungssysteme, Stiefel	VENNO® VET 1 super	1%	Nach der Reinigung Flächen trocknen lassen Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Dosier-Schaumspritze oder Aufwandmenge 0,4 l/m <sup>2</sup> der angegebenen Anwendungskonzentration.			
<b>Spezielle Desinfektion:</b> ▶ gegen Wurmeier ▶ gegen Kokzidien ▶ gegen Cryptosporidien, ▶ gegen Clostridien ▶ gegen Bakterien/Viren	Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Wände bis 1 m Höhe	NEOPREDISAN® 135-1	2,5%	Nach der Grundreinigung bzw. Grunddesinfektion Flächen trocknen lassen. Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Dosier-Schaumspritze. Aufwandmenge 0,4 l/m <sup>2</sup> der angegebenen Anwendungskonzentration.			
<b>Reinigung des Tränkwassersystems:</b> ▶ von Kalkablagerungen, ▶ von Eisenablagerungen, ▶ von Biofilmen, ▶ von Medikamenten	Tränkwasserrohrleitungssystem	MENNO® CLEAN Schaumreiniger	1%	Rohrleitungen befüllen (z.B. über Vorlaufbehälter), Tränken abnehmen, Fallrohre entlüften, mit Stopfen verschließen und 2 Std. umpumpen, Gebrauchslösung ablassen, gründlich nachspülen. Informationen zur Tränkwasserhygiene beachten.			
<b>Desinfektion des Tränkwassersystems:</b> ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Hefepilze, ▶ gegen Algen	Tränkwasserrohrleitungssystem	VENNO® VET 1 super	1%	Rohrleitungen befüllen (z.B. über Vorlaufbehälter), Tränken abnehmen, Fallrohre entlüften und umpumpen, Gebrauchslösung ablassen, gründlich nachspülen. Informationen zur Tränkwasserhygiene beachten.			
<b>Hygienemaßnahmen im belegten und teilgeräumten Stall</b>							
<b>Zwischendesinfektion:</b> ▶ gegen Viren, ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Hefepilze	Decken, Wände, Böden, Geräte, Stalleinrichtungen	VENNO® VET 1 super	1%	Bei Teilaustattung oder Umstallung vorreinigen und antrocknen lassen. Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Dosier-Schaumspritze.			
<b>Spezielle Desinfektion:</b> ▶ gegen Wurmeier, ▶ gegen Kokzidien, ▶ gegen Cryptosporidien ▶ gegen Clostridien,	Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Wände bis 1 m Höhe	NEOPREDISAN® 135-1	2,5%	Nach Verabreichung des Kokzidiostatikums desinfizieren mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Dosier-Schaumspritze. Aufwandmenge 0,4 l/m <sup>2</sup> der angegebenen Anwendungskonzentration.			

# MENNO® HYGIENEPLAN für die Eierproduktion

(Nur für professionelle Anwender) - Seite 2 von 2



Allgemeine Hygienemaßnahmen MENNO Anwendungsempfehlung		Vers. 12/2023	Anwendungsempfehlungen, darüber hinaus Etiketten/Produktinformationen beachten.	Abwandlung von der Empfehlung	Name in Druckschrift	Datum, Unterschrift Beginn/Ende
<b>Fahrzeugdesinfektion</b> ▶ gegen Viren, ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Hefepilze	Fahrzeuge von Lieferanten und Besuchern, Vorplätze Verladeflächen, Räder	VENNO® VET 1 super 1%	Desinfektion z. B. mit MENNO® Dosier- Schaumspritze. Desinfektion mit der Aufwandmenge 0,4 l/m <sup>2</sup> der angegebenen Anwendungskonzentration.			
<b>Desinfektion von Futtersilos usw.</b> ▶ gegen Viren, ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Hefepilze	Alle Vorratsflächen 2x pro Jahr	VENNO® VET 1 super 1%	Futtermittelreste vollständig entfernen. Siloreinigung mit dem Silo-RoBoFox®. Zur Entfernung von Fettrückständen die Flächen mit MENNO® CLEAN Schaumreiniger einweichen lassen. Danach abspülen und Desinfektion mindestens 6 Stunden vor Neubefüllung.			
<b>Personalhygiene durch Stiefeldesinfektion</b> ▶ gegen Viren, ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Hefepilze	Desinfektionsfußwannen am Stalleingang	VENNO® VET 1 super 1%	1-2x wöchentlich wechseln, Überprüfung des pH Wertes (nur bei VET 1 super möglich) mit Indikatorpapier, bei pH Werten über 3 - Produkt nachdosieren. Verschmutzte Lösungen nach Neutralisation entsorgen.			
<b>Desinfektion für Selbstverarbeiter bzw. Selbstvermarkter</b> ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Hefepilze,	Decken, Wände, Böden, Geräte, Einrichtungen, Schneidmesser, Tische, Auslagen	A-QUASAN® 1,5%	Bei allen lebensmittelverarbeitenden Vorgängen sind die HACCP-Richtlinien einzuhalten. Desinfektion mit selbst angemischter Ge-brauchslösung oder MENNO® Dosier-Schaumspritze. Flächen im Kontakt mit Lebensmitteln sind anschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität nach zu spülen.			
<b>Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.</b>						



## Erst desinfizieren, dann produzieren!

### MENNO® Hygienemanagement

MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH · Langer Kamp 104 · D-22850 Norderstedt · Deutschland

T: 040-5290667-0 · F: 040-529066766 · info@menno.de · www.menno.de