

# MENNO Florades®

Pflanzenschutzmittel zur Desinfektion gegen:

**Pilze, Bakterien,  
Viren und Viroide:**



Zul. Nr.: 034407-00

für den Zierpflanzen-, Gemüse- (Zuchtpilze) und Ackerbau (Kartoffel-Lager)

## Hygienemaßnahmen in Kartoffellägern und Vorkeimhäusern

Damit Krankheitserreger der letztjährigen Ernte nicht die neue Kartoffelernte infizieren, ist vor der Neueinlagerung eine gründliche Reinigung und Desinfektion zu empfehlen.

Schmutz und Knollenreste müssen restlos entfernt werden. Die **Reinigung von Kisten, Böden, Wänden, Ladeflächen, Fahrzeugen und Gerätschaften** sollte mit einem Hochdruckreiniger erfolgen. Die Flächen müssen abtrocknen (Grauschimmel des Betons) damit es nicht zu einem Verdünnungseffekt der Desinfektionsmittellösung kommt.

### MENNO Dokumentation:

Gegen „**Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis**“

Gutachten von Herrn Dr. W. Wohanka, FA Geisenheim, vom 03.09.1996

Gegen „**Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus und gegen „Pseudomonas solanacearum**“

Gutachten von Herrn Dr. W. Wohanka, FA Geisenheim, vom 28.04.1997

Gegen „... **PVY, Potato virus Y Potyvirus, ...,PVX, Potato virus X Potexvirus, ... PSTVd, Potato spindle tuber viroid**“

Gutachten von Herrn Prof. Dr. E. Maiß, Universität Hannover, Institut für Pflanzenkrankheiten u. Pflanzenschutz, vom 12.01.1998

Gegen „**Phytophthora cinnamomi, Cydrocladium scoparium, Rhizoctonia solani, Alternaria sp., Colletotrichum sp.**“

Gutachten von Herrn Dr. W. Wohanka, FA Geisenheim, vom 31.08.1998

Gegen „**Ralstonia solanacearum**“

Gutachten von Herrn Dr. W. Wohanka, FA Geisenheim, vom 31.05.2000

Gegen „**Erwinia carotovora ssp. atroseptica, Erwinia carotovora ssp. carotovora, Fusarium solani var. coeruleum, Helminthosporium solani**“

Gutachten von Herrn Dr. W. Wohanka, FA Geisenheim, vom 12.09.2000

### MENNO® Dosier-Schaumspritze

Wir empfehlen die Ausbringung der Gebrauchslösung mit einer Pflanzenschutzspritze oder der MENNO® Dosier-Schaumspritze.

Anwendung auf Flächen, wie z.B.:  
**Lagerhallen, Böden, Wänden, Ladeflächen, Fahrzeugen, Reifen, Laufbändern, Geräten, Rodetechnik, Pflanzmaschinen, Transportbehältern und Kisten.**

Anwendungskonzentration: 2 % = 2 Liter MENNO Florades® auf 100 Liter Wasser

Aufwandmenge Gebrauchslösung: 0,6 bis 0,8 l/m<sup>2</sup> (Fläche tropfnass)



Anschluss an den Wasserschlauch mit der Schnellverschlusskupplung, dosiert das Produkt exakt zu, Ausbringung als Schaum.

- Spritzkontrolle
- Optimierte Einwirkzeit
- Arbeitsschutz

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

## MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH

Langer Kamp 104 · D-22850 Norderstedt · Deutschland

T: 040-5290667-0 · F: 040-529066766 · info@menno.de · www.menno.de